

Vogelart	Erste Eingabe	Zweite Eingabe nach 30 Minuten	Dritte Eingabe nach 60 Minuten	Ab da an alle 2 Stunden Tag und Nacht bis zur eigenständigen Versorgung
Stockente	10ml	15ml	20ml	30ml
Blässhuhn	5ml	10ml	15ml	20- 30ml
Teichhuhn- Ralle	5ml	10ml	15ml	20- 30ml
Reiherente	5ml	10ml	15ml	20ml
Nilgans	20ml	30ml	30- 50ml	40- 60ml
Kanadagans	30ml	40ml	40- 60ml	60- 80ml
Graugans	20ml	30ml	40ml	60ml
Schwan	40ml	60ml	80ml	120- 180ml
Reiher*	20ml	40ml	50ml	60ml
Haubentaucher*	10ml	15ml	20ml	30ml

*Haubentaucher und Reiher sind im Allgemeinen „Fluchtkotzer“. Dies bedeutet, dass sie in Stresssituationen sofort jeglichen Ballast rauswerfen, um leichter zu sein und schneller wegzukommen. Für das Sondieren bedeutet es, dass diese Vögel selbst die verabreichte Flüssigkeit in vielen Fällen direkt wieder auswürgen. In diesen Fällen sofort den Schlauch abklemmen und entfernen. Der Vogel muss direkt die Möglichkeit bekommen, die Flüssigkeit loszuwerden, ohne Tropfen in die Luftröhre zu bekommen. Also muss der Kopf und der Halsbereich losgelassen werden, damit der Vogel alles wegschütteln kann. Für diese Tierarten bietet sich für ungeübte Menschen eher das Infudieren an.